

DIGESTIVE MEDICINE ASSOCIATES, LLP

2140 West 68th Street, Suite 300, Hialeah, FL 33016 | 3133 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables, FL 33134
18044 N.W. 6th Street, Suite 102, Pembroke Pines, FL 33029 | 11410 North Kendall Drive, Suite 311, Miami, FL 33176
3650 NW 82nd Avenue, PH 506, Doral, FL 33166
Ph: 305-822-4107 Fax: 305-822-5086 | digestivemed.com

CLENPIQ INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA

CINCO (5) DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Si usted toma algun medicamento para el dolor o Artritis, por ejemplo: Advil, Motrin, Naproxen, o algun otro medicamento que contiene Aspirina o Anticoagulantes como: Coumadin, Pradaxa o Plavix, **DESCONTINUE** de tomar estos medicamentos cinco (5) dias antes del procedimiento.

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Dieta de liquidos transparentes SOLAMENTE. Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Liquidos transparentes incluyen; Jugos de manzana o uva blanca, Sprite, Gatorade, Caldo de pollo, Jello (no puede ser de color ROJO) y te. **COMIDA SOLIDA NO!!!!**

1. Entre las **5:00 pm y las 9:00 pm** tome un frasco de Clenpiq.
2. Despues tome 5 tazas (de 8 onzas cada una) de liquidos transparentes.
3. Tome todo durante las 5 horas siguientes .
4. El dia de la prueba debe de tomar mucho liquidos transparentes.
5. **No** puedes tomar ningun medicamento para la Diabetes la noche antes o la manana del procedimiento.

EN LA MANANA DE EL EXAMEN:

1. **5 horas** antes de su procedimiento tome el otro frasco de Clenpiq. Tome al menos 24 oz (3 tazas) de liquidos transparentes despues del frasco.
Asegurate que tomes toda las 24 onzas de liquidos transparentes 2 horas antes del procedimiento.

PARE DE TOMAR TODO LIQUIDOS 2 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO.

2. Si usted esta tomando algun medicamento para controlar la presion arterial, continue su medicamento a la hora usual con una cantidad minima de agua el dia del procedimiento.