

## **DIGESTIVE MEDICINE ASSOCIATES, LLP**

2140 West 68<sup>th</sup> Street, Suite 300, Hialeah, FL 33016 | 3133 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables, FL 33134  
18044 N.W. 6<sup>th</sup> Street, Suite 102, Pembroke Pines, FL 33029 | 11410 North Kendall Drive, Suite 311, Miami, FL 33176  
3650 NW 82<sup>nd</sup> Avenue, PH 506, Doral, FL 33166  
Ph: 305-822-4107 Fax: 305-822-5086 | [digestivemed.com](http://digestivemed.com)

### **MoviPrep INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA**

#### **CINCO (5) DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

- Si usted toma algun medicamento para el dolor o Artritis, por ejemplo: Advil, Motrin, Naproxen, o algun otro medicamento que contiene Aspirina o Anticoagulantes como: Coumadin, Pradaxa o Plavix, **DESCONTINUE** de tomar estos medicamentos cinco (5) dias antes del procedimiento.

#### **DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

**Dieta de liquidos transparentes SOLAMENTE.** Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Liquidos transparentes incluyen; Jugos de manzana o uva blanca, Sprite, Gatorade, Caldo de pollo, Jello (no puede ser de color ROJO) y te. **NINGUNA COMIDA SOLIDA!!!!**

1. A las **7:00 pm** Vacie una bolsa A y una bola B en el recipiente desechable.
2. Agregue agua potable tibia hasta la linea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver.
3. El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solucion hasta la marca siguiente, hasta completar todo el litro.
4. En la proxima hora Beba 16 oz del liquido claro de su preferencia. Y despues siga tomando muchos liquidos claros hasta que se duerma.
5. **No** puedes tomar ningun medicamento para la Diabetes la noche antes o la manana del procedimiento.

#### **EN LA MANANA DE EL EXAMEN:**

1. **Por lo menos 3 HORAS** antes de su prueba **repita pazos 1-4.** Asegurate que termines tomando toda la preparacion por lo menos 2 horas antes de su prueba.

Despues de completar estos pasos PARE de tomar liquidos.

2. Si usted esta tomando algun medicamento para controlar la presion arterial, continue su medicamento a la hora usual con una cantidad minima de agua el dia del procedimiento.