

## DIGESTIVE MEDICINE ASSOCIATES, LLP

2140 West 68<sup>th</sup> Street, Suite 300, Hialeah, FL 33016 | 3133 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables, FL 33134  
18044 N.W. 6<sup>th</sup> Street, Suite 102, Pembroke Pines, FL 33029 | 11410 North Kendall Drive, Suite 311, Miami, FL 33176  
3650 NW 82<sup>nd</sup> Avenue, PH 506, Doral, FL 33166  
Ph: 305-822-4107 Fax: 305-822-5086 | [digestivemed.com](http://digestivemed.com)

## **SUPREP INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA**

### **CINCO (5) DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

- Si usted toma algun medicamento para el dolor o Artritis, por ejemplo: Advil, Motrin, Naproxen, o algun otro medicamento que contiene Aspirina o Anticoagulantes como: Coumadin, Pradaxa o Plavix, **DESCONTINUE** de tomar estos medicamentos cinco (5) dias antes del procedimiento.

### **DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

**Dieta de liquidos transparentes SOLAMENTE.** Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Liquidos transparentes incluyen; Jugos de manzana o uva blanca, Sprite, Gatorade, Caldo de pollo, Jello (no puede ser de color ROJO) y te. **COMIDA SOLIDA NO!!!!!!**

1. A las **7:00 pm** hechar una botella (6 oz) la botella de Suprep en el envase plastico.
2. Anadir agua fria hasta la linea de 16 onzas en el envase y mezclalo bien.
3. Durante una hora toma **TODO** la solucion.
4. En la proxima hora tienes que tomar (2) mas envases de 16 onzas de agua.
5. **No** puedes tomar ningun medicamento para la Diabetes la noche antes o la manana del procedimiento.

### **EN LA MANANA DE EL EXAMEN:**

1. **Por** lo menos 3 horas antes de su procedimiento usando la otra botella de 6-onzas de Suprep **repite pazos 1-4.** Asegurate que tomes toda las 16 onzas de agua durante la misma hora.

**PARE DE TOMAR TODO LIQUIDOS 2 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO.**

2. Si usted esta tomando algun medicamento para controlar la presion arterial, continue su medicamento a la hora usual con una cantidad minima de agua el dia del procedimiento.