

DIGESTIVE MEDICINE ASSOCIATES, LLP

2140 West 68th Street, Suite 300, Hialeah, FL 33016 | 3133 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables, FL 33134
18044 N.W. 6th Street, Suite 102, Pembroke Pines, FL 33029 | 11410 North Kendall Drive, Suite 311, Miami, FL 33176
3650 NW 82nd Avenue, PH 506, Doral, FL 33166
Ph: 305-822-4107 Fax: 305-822-5086 | digestivemed.com

SUTAB INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA

CINCO (5) DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Si usted toma algun medicamento para el dolor o Artritis, por ejemplo: Advil, Motrin, Naproxen, o algun otro medicamento que contiene Aspirina o Anticoagulantes como: Coumadin, Pradaxa o Plavix, **DESCONTINUE** de tomar estos medicamentos cinco (5) dias antes del procedimiento.

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Dieta de liquidos transparentes SOLAMENTE. Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Liquidos transparentes incluyen; Jugos de manzana o uva blanca, Sprite, Gatorade, Caldo de pollo, Jello (no puede ser de color ROJO) y te. **COMIDA SOLIDA NO!!!!**

1. A las **7:00 pm** Abra 1 frasco de 12 pastillas.

2. Llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague UNA pastilla cada 2 minutos con un sorbo de agua y beba la cantidad completa durante 15 a 20 minutos.

Si se siente incómodo, tome las tabletas y el agua más lentamente.

3. Aproximadamente 1 hora después de tragar la última pastilla, llene el recipiente provisto por segunda vez con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad completa durante 30 minutos.

4. Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad completa durante 30 minutos.

5. No puedes tomar ningun medicamento para la Diabetes la noche antes o la manana del procedimiento.

EN LA MANANA DE EL EXAMEN:

1. Al menos de 5 a 8 horas ante del procedimiento, repita los pasos 1 a 4, utilizando el segundo frasco de pastillas. Debe usar todas las pastillas y el agua al menos 2 horas antes de su procedimiento.

PARE DE TOMAR TODO LIQUIDOS 2 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO.

2. Si usted esta tomando algun medicamento para controlar la presion arterial, continúe su medicamento a la hora usual con una cantidad minima de agua el dia del procedimiento.