

DIGESTIVE MEDICINE ASSOCIATES, LLP

2140 West 68 Street, Suite 300 Hialeah, FL 33016 | 3133 Ponce de Leon Boulevard Coral Gables, FL 33134
18044 N.W. 6 Street, Ste 102 Pembroke Pines, FL 33029 | 11410 N. Kendall Drive, Ste 311 Miami, FL 33176
3650 N.W. 82nd Ave, PH506, Doral, FL 33166
Ph: 305-822-4107 | Fax: 305-822-5086 | digestivemed.com

Francisco R. Maderal, MD
Jorge D. Castaneda, MD
Juan Pablo Blum Guzman, MD

Jeff O. Gonzalez, MD
Victor Padilla III, MD

Jose L. Martinez, MD
Joel Kertznus, MD
Vanessa Mendez, MD

SUTAB INSTRUCCIONES PARA COLONOSCOPIA

CINCO (5) DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Si usted toma algún medicamento para el dolor o Artritis, por ejemplo: Advil, Motrin, Naproxen, o algún otro medicamento que contiene Aspirina o Anticoagulantes como: Coumadin, Pradaxa o Plavix, **DESCONTINUE** de tomar estos medicamentos cinco (5) días antes del procedimiento.

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Dieta de líquidos transparentes SOLAMENTE. Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Líquidos transparentes incluyen; Jugos de manzana o uva blanca, Sprite, Gatorade, Caldo de pollo, Jello (no puede ser de color ROJO) y te. **iiiiiiCOMIDA SOLIDA NO!!!!!!**

1. A las **7:00 pm** Abra 1 frasco de 12 pastillas.
2. Llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague UNA pastilla cada 2 minutos con un sorbo de agua y beba la cantidad completa durante 15 a 20 minutos.

Si se siente incómodo, tome las tabletas y el agua más lentamente.
3. Aproximadamente 1 hora después de tragar la última pastilla, llene el recipiente provisto por segunda vez con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad completa durante 30 minutos.
4. Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad completa durante 30 minutos.
5. **No** puedes tomar ningún medicamento para la Diabetes la noche antes o la mañana del procedimiento.

EN LA MANANA DE EL EXAMEN:

1. Al menos de 5 a 8 horas antes del procedimiento, repita los pasos 1 a 4, utilizando el segundo frasco de pastillas. Debe usar todas las pastillas y el agua al menos 2 horas antes de su procedimiento.

PARE DE TOMAR TODO LIQUIDOS 2 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO.

2. Si usted está tomando algún medicamento para controlar la presión arterial, continúe su medicamento a la hora usual con una cantidad mínima de agua el día del procedimiento.

Para los pacientes que se inyectan con MEDICAMENTOS PARA PERDER PESO como Ozempic, Wegovy, Semaglutide, Mounjaro Tirzepatide, DEBEN SUSPENDER el medicamento al menos 7 días antes del procedimiento.

LUGAR DEL PROCEDIMIENTO:

A) Palmetto Surgery Center: 2140 W. 68th Street, Suite 102, Hialeah, FL 33016 Teléfono: 305-512-8220

Durante el horario de 8:00am a 11:00am, el estacionamiento está muy congestionado. Por favor considere tomar un-Uber/Lyft o que lo dejen.

B) Surgery Center of Miami, 21 SW 57th Ave, Miami, FL 33144 Teléfono: 305-842-5933

Llame al 305-414-6274 o 305-419-0066 si tienes pregunta sobre su preparación o como tomar la preparación o problemas con su receta para la preparación.

Si tienes fiebre o toz o has estado en contacto con una persona o lugar con sospecha de haber estado predispuesto a la Coronavirus (Covid-19), por favor llámenos para cambiar su fecha de cita. Para la salud de los otros pacientes no haremos su procedimiento.

Su médico le ha recomendado procedimientos, pruebas diagnósticas, o laboratorios. Su médico le indique que estos servicios deben ser completados en un máximo de tres semanas y que usted tenga la oportunidad de revisar los resultados clínicos y discutir su plan de tratamiento con su médico. Si usted no puede asistir a sus citas debe dejar saber a su médico.

Asegúrese de organizar el transporte para después de su procedimiento. No debe conducir un vehículo por 24 horas después del procedimiento debido a la sedación que recibió. También debe tener un adulto responsable que permanezca con usted por 24 horas después del procedimiento. Si tiene una verdadera emergencia médica, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. No traiga joyas, dentaduras o audífonos. No somos responsable para artículos personales.

ENTIENDO QUE ES MI RESPONSABILIDAD Y HE DISPUESTO PARA QUE UN ADULTO RESPONSABLE ME CONDUZCA A CASA Y PROPORCIONE ASISTENCIA TRAS EL PROCEDIMIENTO. RECONOZCO QUE ME ACONSEJARON NO CONDUCIR HASTA QUE LOS EFECTOS DE CUALQUIER MEDICAMENTO SE HAYAN DESARROLLADO, NORMALMENTE POR LAS PRIMERAS 24 HORAS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO. ENTIENDO QUE ESTO SIGNIFICA QUE NO DEBO CONDUCIR HASTA EL DÍA DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO O SEGÚN LO INDICA EL CIRUJANO.

COPAGOS Y/O DEDUCIBLES SERAN PAGADOS EN TOTAL 72 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: Usted pudiera tener DOS CARGOS SEPARADOS antes del procedimiento: Doctor y/o Ambulatorio

Para cancelar su procedimiento debe de avisar con 72 horas de anticipación o será aplicado un cargo de \$100.00

Es importante que vengas al procedimiento porque existe la posibilidad de que no sea detectado algún cáncer si no viene a la visita.

PLANIFIQUE ESTAR 1-5 HORAS PARA EL PROCEDIMIENTO. RECIBIRAS UNA LLAMADA EL DIA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO Y PUEDE SER QUE CAMBIEN LA HORA. NO ENTRARA A SU PROCEDIMIENTO EXACTAMENT A LO HORA INDICADA EN ESTA CITA.

SI SE VA A HACER UNA COLONOSCOPIA POR FAVOR RECOJA SU PREPARACION EN LOS PROXIMOS 7 DIAS.

Participación financiera y derecho de propiedad del médico: El centro es, en parte, propiedad de médicos. Es posible que el (los) medico(s) que le remitió (remitieron) a este centro y que le realizara(n) su(s) procedimiento(s) tenga(n) una participación financiera y un derecho de propiedad en relación con este centro. Los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento en otro establecimiento de atención de la salud que elijan. Revelamos esta información de conformidad con las reglamentaciones federales.